

Cortinarius tubarius AMMIRATI & SMITH 1972						
Dermocybe tubaria (AMMIRATI & SMITH) AMMIRATI 1988 // Dermocybe sphagnogena MOSER 1973 //						
Cortinarius sphagneti ORTON 1958						
Sumpfmoss - Hautkopf						
Leg.:	, PETER		Det.:	, PETER		
			Rev.:	Prof. HARDTKE, H.J. / (ergebnisoffen)		
Lok.:	NSG - Hochmoor Grünheide		MTB:	5540 ; 24		
Hab.:	im Randbereich des Hochmoores					
Substrat:	im feuchten Sphagnum sp.					
Geruch:	nicht definiert					
Datum:	11.08.2012		Höhe / NN	750 m	Beleg-Nr.:	
Fundbeschreibung:						
Hut stumpf gebuckelt, konvex, gelboliv - rötlichbraun, Huthaut mit ca. 20% KOH dunkelbraun						
Lamellen mehr <u>olivgelb</u> (olivgrün ?)						
Stiel sehr lang, kahl , blaß ockergelb bis schmutzig ocker						
Mikromerkmal	Sporen ellipsoid, gelblich, feinwarzig			Sporenstaub	rostbraun	
	Hyphen mit Schnallen ; Basidien hyalin (sehr vereinzelt mit Körnelung) ;					
	8,7	X	4,9		X	
	9,7	X	4,9		X	
	8,7	X	4,9		X	
	7,8	X	5,3		X	
	8,7	X	4,9		X	
	8,3	X	4,9		X	
	8,3	X	5,8		X	
	7,8	X	5,3		X	
	9,7	X	7,8		X	
	9,7	X	5,8		X	